



MY WAY TO GROW

 **Düngeplan
Kokos**

 **Plán hnojení pro kultivaci
s výrobky Coco**

 **Coco
műtrágyázási terv**

MAIN FERTILIZERS

STIMULATORS



Coco
Forte
A

Coco
Forte
B

EC**

ML /
10 LTR

Roots

X-cel

The
Missing
Link

BN-Zym

Vítasol

Silution

| | Coco Forte A | Coco Forte B | EC** | ML / 10 LTR | Roots | X-cel | The Missing Link | BN-Zym | Vítasol | Silution |
|---|--------------|--------------|------|-------------|-------|-------|------------------|--------|---------|----------|
| Wachstumsphase Doba rústu Növekedési időszak | 9 | 9 | 0,9 | | 8 | 5 | 6 | 5 | - | 2 |
| Beginn Blütephase Počáteční fáze kvetení Virágzás kezdő időszaka | 13 | 13 | 1,2 | | 7 | 5 | 6 | 5 | - | 2 |
| | 16 | 16 | 1,4 | | 5 | 8 | 6 | 5 | - | 2 |
| | 18 | 18 | 1,6 | | - | 8 | 6 | 5 | - | 2 |
| Mitte Blütephase Střední fáze kvetení Virágzás középső időszaka | 18 | 18 | 1,6 | | - | 10 | 6 | 5 | - | 2 |
| | 18 | 18 | 1,6 | | - | 10 | 6 | 5 | 4 | 2 |
| Ende Blütephase Závěrečná fáze kvetení Virágzás végső időszaka | 16 | 16 | 1,4 | | - | 10 | 6 | 5 | 8 | 2 |
| | <13 | <13 | 1,2 | | - | 10 | 6 | 5 | 10 | 2 |
| Letzten Woche / Spülen Poslední týden opláchněte Öblítés utolsó héten | - | - | - | | - | - | - | 5 | 7 | - |



SUBSTRATES



Cocomix Plus



Coco Brick



Tippcs Coco

- Bei Verwendung von Coco Forte A+B: Mischen Sie zuerst A, und dann B in das Gefäß.
- Wenn Sie Silution verwenden, geben Sie zuerst Wasser in das Gefäß, dann Silution und rühren Sie gut um. Warten Sie 30 Minuten und mischen Sie dann den Hauptdünger und die Stimulatoren hinzu.
- Stellen Sie den pH-Wert auf $\pm 5,5 - 6,5$ ein.
- Für die besten Ergebnisse empfehlen wir die Verwendung von Cocomix Plus oder Coco Bricks.
- In Gebieten mit weichem Wasser oder bei Verwendung von RO-Wasser wird empfohlen, den Düngemittel-Mix Ca 15 (± 4 ml./10 Liter) und MgO 10 (± 4 ml./10 Liter) zuzusetzen.
- Die Dosierung der Düngemittel kann in Schritten von 10% mehr oder weniger eingestellt werden.
- Bei langblühenden Pflanzen und bei Verwendung von Longflower-Supermix sollte der Zeitplan eingehalten werden, und ab der Mitte der Blüte verlängert werden.

** Der EC-Wert von Osmosewasser mit EC 0.0 gemessen.



Longflower
Supermix

Autoflower
Supermix

Tipy Coco

- Při použití Coco Forte A+B: nejprve namíchejte do nádoby A, pak přimíchejte B.
- Pokud používáte Silution, nejprve dejte do nádoby vodu, poté přidejte Silution a dobře zamíchejte. Vyčkejte 30 minut, poté přimíchejte hlavní hnojiva a stimulatory.
- Upravte pH na $\pm 5,5-6,5$.
- Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme použít náš Cocomix Plus nebo Coco Bricks.
- V oblastech s měkkou vodou nebo v případě, že používáte vodu z reverzní osmózy, doporučujeme přidat do směsi hnojiva Ca 15 (± 4 ml./10 l) a MgO 10 (± 4 ml./10 l).
- Dávkování hnojiva lze upravit v krocích po ± 10 %.
- Pro rostliny s dlouhou dobou kvetení a v případě, že používáte Longflower-Supermix, je třeba prodloužit harmonogram ze střední doby kvetení.

** Hodnota EC se měří s vodou z reverzní osmózy s EC 0,0.

Típek a Coco-hoz

- Coco Forte A+B használatá esetén: először keverje el az A-t az edényben, majd keverje bele a B-t is.
- Ha Silution-t használ, akkor öntse a vizet az adagoló edénybe, majd tegye bele a Silution-t, és alaposan keverje össze. Várjon 30 percet, majd keverje össze a fő műtrágyákat és a stimulatorokat.
- Állítsa be a pH-t $\pm 5,5-6,5$ között.
- A legjobb eredmény elérése érdekében javasoljuk, hogy használja Cocomix Plus vagy Coco Bricks termékünket.
- Lágy víz vagy RO-víz (fordított ozmózis) használata esetén javasoljuk, hogy adjon Ca 15-öt (± 4 ml./10 liter) és MgO 10-et (± 4 ml./10 liter) a műtrágyakeverékhez.
- A műtrágyák adagolását $\pm 10\%$ -kal tudja beállítani.

- Hosszan virágzó növényeknél és a Longflower-Supermix használata esetén az ütemezést meg kell hosszabbítani a virágzás középeitől.

** Az EC érték fordított ozmózisos vízzel EC 0,0-val mérve.



MY WAY TO GROW

Σχέδιο λίπανσης με Coco

План за торене с Coco при култивирание

תוכנית דישון: גידול בתערובות קוקוס



Συμβουλές για το Coco

- Κατά τη χρήση Coco Forte A+B: αναμείξτε πρώτα το A και έπειτα το B.
- Όταν χρησιμοποιείτε το Silution, προσθέστε πρώτα νερό στο δοχείο, στη συνέχεια το Silution και αναδεύστε καλά. Περιμένετε 30 λεπτά και αναμείξτε τα βασικά λιπάσματα και τα διεγερτικά.
- Ρυθμίστε το pH σε $\pm 5.5 - 6.5$.
- Για βέλτιστο αποτέλεσμα συνιστούμε τη χρήση των προϊόντων μας Cosomix Plus ή Coco Bricks.
- Σε περιοχές με μαλακό νερό ή κατά τη χρήση νερού αντίστροφης όσμωσης συνιστάται η προσθήκη Ca 15 (± 4 ml./10 λίτρα) και MgO 10 (4 ml./10 λίτρα) στο μείγμα λιπάσματος.
- Η δοσολογία του βασικού λιπάσματος μπορεί να έχει απόκλιση $\pm 10\%$.
- Σε φυτά μακράς ανθοφορίας και κατά τη χρήση του Longflower-Supermix το σχήμα θα πρέπει να παραταθεί από τη μέση της περιόδου ανθοφορίας.
- ** Οι τιμές EC μετρώνται σε νερό αντίστροφης όσμωσης με EC 0.0.

MAIN FERTILIZERS

STIMULATORS



Coco Forte A, Coco Forte B, EC**, ML / 10 LTR, Roots, X-cel, The Missing Link, BN-Zym, Vitasol, Silution

| | Coco Forte A | Coco Forte B | EC** | ML / 10 LTR | Roots | X-cel | The Missing Link | BN-Zym | Vitasol | Silution |
|--|--------------|--------------|------|-------------|-------|-------|------------------|--------|---------|----------|
| Περίοδος ανάπτυξης Период на растеж תקופת צמיחה | 9 | 9 | 0,9 | | 8 | 5 | 6 | 5 | - | 2 |
| Έναρξη περιόδου ανθοφορίας Начална фаза на цъфтеж התחלת שלב הפריחה | 13 | 13 | 1,2 | | 7 | 5 | 6 | 5 | - | 2 |
| | 16 | 16 | 1,4 | | 5 | 8 | 6 | 5 | - | 2 |
| | 18 | 18 | 1,6 | | - | 8 | 6 | 5 | - | 2 |
| Μέση περίοδος ανθοφορίας Средна фаза на цъфтеж אמצע שלב הפריחה | 18 | 18 | 1,6 | | - | 10 | 6 | 5 | - | 2 |
| | 18 | 18 | 1,6 | | - | 10 | 6 | 5 | 7 | 2 |
| Τελευταία περίοδος ανθοφορίας Финална фаза на цъфтеж שלב הפריחה האחרון | 16 | 16 | 1,4 | | - | 10 | 6 | 5 | 8 | 2 |
| | <13 | <13 | 1,2 | | - | 10 | 6 | 5 | 10 | 2 |
| Τελευταία εβδομάδα έκπτυξης Промиване в последната седмица. יש לזטוש בשבוע האחרון. | - | - | - | | - | - | - | 5 | 7 | - |

Longflower Supermix



Autoflower Supermix

Полезни съвети за Coco

- Κοгато използвате Coco Forte A + B, смесете първо A в съда, след което смесете с B.
- Κοгато използвате Silution, добавете първо вода в съда за подхранване, след което добавете Silution и разбъркайте добре. Изчакайте 30 минути и след това смесете основните торове и стимулатори.
- Ρегулирайте pH на $\pm 5,5 - 6,5$.
- За най-добър резултат препоръчваме да използвате нашия Cosomix Plus или Coco Bricks.
- В райони с мека вода или при използване на вода, пречистена с обратна осмоса, се препоръчва добавяне на Ca 15 (± 4 ml./10 литρα) и MgO 10 (± 4 ml./10 литρα) в торната смес.
- Дозировката на торовете може да се регулира на степени от приблизително 10%.
- За растения с дълъг цъфтеж и при използване на Longflower-Supermix, схемата за торене трябва да се удължи от средата на цъфтежа.
- ** Стойността на EC се измерва с вода с обратна осмоса с EC 0,0.

טיפים לשימוש בקוקוס

- שימוש בקוקוס פורט A + B: מוסיפים ומערבבים תחילה את A במיכל ההשקיה, ולאחר מכן מוסיפים ומערבבים את B.
- שימוש עם סיליקה (Silution) יש להוסיף תחילה מים למכלי ההזנה ואחר כך את תוסף הסיליקה. ערבבו היטב והמתינו 30 דקות, לאחר פועלה זו מוסיפים ומערבבים פנימה את דשני הבסיס והתוספים השונים.
- יש לאזן את רמת ה-pH ל- $5.5 - 6.5$.
- לקבלת התוצאות הטובות ביותר אנו ממליצים להשתמש ב-Cocomix Plus או ב-Coco bricks באזורים של מים רכים או בשימוש במי אוסמוזה הפוכה, מומלץ להוסיף 4 Ca 15 (± 4 ml./10 ליטר) ו-MgO 10 (± 4 ml./10 ליטר) לתערובת הדשנים.
- לקבלת התוצאה הטובה ביותר אנו ממליצים להשתמש במצע הגידול שלנו - Bio Soilmix. ניתן להגדיל את מיון הדשנים בקפיצות של 10% פחות או פחות.
- עבור צמחים פורחים ארוכים וכאשר משתמשים ב-Longflower-Supermix, יש להרחיב את לוח הזמנים החל מפריחת אמצע.
- ** ערך ה-EC נמדד בשימוש עם מי אוסמוזה הפוכה כאשר הערך עומד על EC= 0.0

SUBSTRATES



Cocomix Plus



Coco Brick

The most cost-effective fertilizers in the world?

WWW.BIONOVA.NL



FACEBOOK.COM/BIONOVAPREMIUM



INSTAGRAM.COM/BIONOVANUTRIENTS